

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

CLP 22-5-73 527944

BULLETIN  
TECHNIQUE  
DES  
STATIONS  
D'AVERTISSEMENTS  
AGRICOLES

## EDITION DE LA STATION "ALSACE ET LORRAINE"

(BAS-RHIN, HAUT-RHIN, MEURTHE-ET-MOSELLE, MEUSE, MOSELLE, VOSGES)

Cité Administrative - 67084 STRASBOURG CEDEX  
Tél. 34-14-63 - Poste 93

ABONNEMENT ANNUEL 30 F

C. C. P. STRASBOURG 55-08-00 F  
Régisseur de recettes D.D.A.  
2, Rue des Mineurs  
67070 STRASBOURG-CEDEX

Supplément n° 3 au Bulletin n° 152 du mois de Mai 1973

21 Mai 1973

### ARBRES FRUITIERS A PEPINS

- POMMIER - POIRIER -

#### TAVELURES DU POMMIER ET DU POIRIER

Depuis le dernier traitement, la végétation a été assez rapide malgré les quelques nuits fraîches enregistrées la semaine dernière. De ce fait, une surface foliaire assez importante se trouve sans protection. D'autre part, des contaminations graves sont à attendre au cours des prochaines pluies.

Il est donc nécessaire de renouveler le traitement fongicide dès réception.

Un insecticide ne sera ajouté à la bouillie que si cela est absolument nécessaire. La pratique des traitements mixtes systématiques (fongicide + insecticide) est absolument à proscrire.

Nous signalons aux arboriculteurs, que les premières taches primaires ont été observées le 15 Mai, dans le Nord de l'ALSACE.

#### OIDIUM DU POMMIER

Profiter de l'intervention contre la Tavelure pour poursuivre la lutte contre l'Oïdium. Poursuivre l'élimination des pousses oïdiées.

### PETITS FRUITS

- FRAMBOISIERS -

#### DESSECHEMENT DES RAMEAUX (Didymella applanata)

Renouveler le traitement conseillé dans notre note du 3 Mai. Avoir soin que la pulvérisation pénètre bien à l'intérieur des lignes, afin d'assurer une protection aussi correcte que possible des jeunes pousses.

.../...

GRANDES CULTURES

- BETTERAVES INDUSTRIELLES -

PEGOMYIE

Le temps chaud et sec que nous avons connu la semaine dernière a favorisé les vols de Pégomyie et l'activité de ce ravageur a augmenté.

De nouvelles pontes ont été déposées à la face inférieure des jeunes feuilles dans toutes les parcelles de betteraves sucrières de la Circonscription.

Le nombre des pontes dépasse maintenant le seuil de tolérance.

Un traitement devra donc être exécuté dans les meilleurs délais.

Les premières mines ont été observées le 14 Mai.

Les éclosions sont maintenant très rapides.

Nous rappelons que l'aldicarbe, le carbofuran et le phorate, utilisés en traitement insecticide du sol, sont également efficaces sur Pégomyie.

- HOUBLON -

MILDIOU

L'état sanitaire des houblonnières est très satisfaisant, malgré l'apparition de quelques pousses spiciformes.

En raison de l'élongation rapide des lianes au cours de ces derniers jours (75 cm en moyenne dans les 5 derniers jours), le renouvellement du traitement s'impose dans toutes les houblonnières.

PUCERONS

Aucune migration de Pucerons ailés n'a été constatée à ce jour.

CULTURES LEGUMIERES

- ASPERGE -

MOUCHE DE L'ASPERGE

Les vols de Mouche de l'asperge se poursuivent.

La protection des aspergeraies non en production doit être maintenue. Un deuxième traitement insecticide devra être effectué au cours de la présente semaine.

- CELERI -

SEPTORIOSE DU CELERI

Dans les cultures de céleri en place, il est conseillé d'effectuer un traitement contre la Septoriose.

Utiliser l'un des produits suivants :

- produits cupriques	: 250 g de Cu/hl !	- doguadine	: 100 g/hl
- oxyquinoléate de cuivre	: 60 g/hl	! - mancozèbe	: 160 g/hl
- captafol	: 160 g/hl	! - manèbe	: 160 g/hl
- carbatène + manèbe	: 40 + 120 g/hl	! - propinèbe	: 210 g/hl

Les Ingénieurs chargés des  
Avertissements Agricoles :  
C. GACHON et Ch. JANUS.

L'Ingénieur en Chef d'Agronomie, Chef de la  
Circonscription Phytosanitaire  
" ALSACE et LORRAINE "  
J. HARRANGER.

Dernière Note parue : Supplément n° 2 au Bulletin n° 152 publié le 14 Mai 1973.